Projet subventionné par le FRSQ

La psychopathie chez les femmes: Symptomatologie clinique, conceptualisation et évaluation. ***E. Forouzan***

Le trouble de la personnalité psychopathique manifesté par les femmes occupe une place croissante dans les préoccupations des professionnels de la santé mentale et du système judiciaire, surtout en raison du manque de connaissance sur la symptomatologie clinique et l'expression de ce trouble. En effet, bien que les impressions cliniques des intervenants des milieux médicaux, sociaux et légaux, ainsi que les rares études empiriques suggèrent une prévalence élevée de ce trouble dans la population carcérale féminine, peu d'études se sont intéressées à ce sujet.

Les résultats des quelques études effectuées auprès de cette clientèle portent essentiellement sur la prévalence de la psychopathie et suggèrent que la symptomatologie clinique et l'expression de la psychopathie seraient différentes entre les hommes et les femmes. Toutefois, les résultats de ces études restent imprécis et peu concluants. Ces différences entre la constellation des symptômes et l'expression de la psychopathie rapportées entre les sexes sont essentielles à la conceptualisation et l'évaluation de la psychopathie féminine.

Si la psychopathie se manifeste différemment à travers les sexes, le groupe de symptômes considérés comme étant les meilleurs indicateurs de la psychopathie chez les hommes pourrait être inapproprié et insensible à l'identification de ce trouble chez les femmes. Dans ce cas, la conceptualisation et, par conséquent, l'évaluation de la psychopathie féminine devraient être basées sur d'autres caractéristiques que celles établies pour les hommes psychopathes.

Actuellement, l'évaluation de la psychopathie, aussi bien auprès des hommes que des femmes, s'effectue à l'aide de l'*Échelle de psychopathie de Hare (P*CL-R, Hare, 1991). Bien que cet outil permetde détecter la présence de la psychopathie chez les femmes, les résultats des études suggèrent que certains items et critères descriptifs des items de la PCL-R ne sont pas assez sensibles pour identifier des caractéristiques de la psychopathie spécifiques aux femmes.

Ainsi, l'amélioration des connaissances sur la psychopathie féminine nécessiterait non seulement l'élaboration d'une conceptualisation propre aux femmes présentant ce trouble, mais aussi l'élaboration d'un outil distinct standardisé, avec des items opérationnalisés, regroupant les différents symptômes et manifestations de ce trouble chez les femmes, et servant à des fins cliniques aux professionnels de la santé mentale et du système judiciaire afin de poser un diagnostic objectif, prédire le fonctionnement dans un programme thérapeutique et évaluer le risque de récidive chez ces femmes.

Compte tenu de ces éléments, le but de la présente étude est de proposer une conceptualisation de la psychopathie féminine à partir de l'étude des caractéristiques et expressions affectives, interpersonnelles et comportementales propres à la psychopathie féminine, d'une part, et de procéder à l'élaboration d'un outil d'évaluation objective et systématique de ce trouble, d'autre part.

Pour y parvenir, dans un premier temps, une grille d'évaluation de la psychopathie chez les femmes sera élaborée à partir des critères de définition de la psychopathie tel que rapportés dans la littérature, et à partir des impressions cliniques de professionnels intervenant auprès des femmes présentant des troubles de la personnalité et des comportements criminels. Dans un deuxième temps, cette grille sera complétée et validée auprès de 300 femmes incarcérées, et ce, sur une période de trois ans.